


EMAKAKAELA KONISATSIION

Emakakaela konisatsioon on operatsioon, mille käigus eemaldatakse emakakaelast koonusekujuline koetükk. Konisatsiooni teostatakse üldjuhul operatsioonisaalis üldnarkoosis. Operatsioon kestab 15 – 30 minutit. Konisatsiooni eesmärgiks on emakakaelast muutunud piirkond välja lõigata. Selleks kasutatakse elekterlingu või elektrinuga. Allesjäänud emakakaela pinnalt tekkiv veritsus suletakse õmbluste või diatermokoagulaatoriga (kõrvetamisega) ning tuppe jäetakse tampon, mis hiljem eemaldatakse. Eemaldatud emakakaela osa saadetakse koe uuringule, mille vastus saabub 10 päeva möödudes.



Emakakaelast eemaldatakse koonusekujuline koetükk



Konisatsiooni teostatakse elekterlinguga

Nagu kõikide kirurgiliste operatsioonide puhul, võib ka emakakaela konisatsiooniga kaasned tüsistusi. Üks võimalikest tüsistustest on verejooks vahetult pärast operatsiooni või hilisemas perioodis (1 – 2 nädalat peale operatsiooni). Tekkinud verejooks võib vajada korduvat õmblemist või koaguleerimist (kõrvetamist). Kui eemaldatud koetükk oli suur, võib konisatsioonijärgselt tekkida emakakaela puudulikkus. Emakakaela puudulikkuse korral on oluliselt suurem risk raseduse katkemiseks ja enneaegseks sünnituseks. Emakakaela puudulikkust saab raseduse ajal korrigeerida emakakaelale tugevdava õmbluse asetamisega. Üldjuhul kulgeb rasedus selle protseduuri järgselt normaalselt. Elekterlingu kasutades võib tekkida naha kahjustus (arm) elektroodi piirkonda. Harva esinev tüsistus on allergiline reaktsioon narkoosi ravimitele. **Operatsioonile saabudes peate olema vähemalt 6 tundi söömata – joomata.** Ei tohi suitsetada, ega närida närimiskummi.

Tüsistuste puudumisel lubatakse Teid koju operatsioonipäeval mitte vähem kui 4 tundi pärast operatsiooni. Autoga sõita pärast operatsiooni ei tohi ning süüa ei soovitata enne kui 6 tundi on möödunud.

Konisatsiooni järgselt toimub emakakaela paranemine ühe kuu jooksul. Sellel perioodil esineb normist suurem tupevoolus, mis võib olla ka halvalõhnaline. Nelja nädala jooksul ei ole soovitatav elada suguelu, käia vannis (k.a. ujumine), tõsta raskusi üle 7 kg, kasutada tampoone, et vältida verejooksu või põletiku teket.

Patsiendi nimi		Allkiri	
Nõustava arsti nimi		Allkiri	

Kuupäev: ____ . ____ 200 ____ a.

Infoleht täidetakse kahes eksemplaris, millest üks jääb patsiendile ja teine haigusloo vahele.