

Kõrvalestaplastika

Operatsiooni näidustused

- kõrvalestade asümmeetria
- peast eemalehoidvad kõrvad

Enne operatsiooni

- Kui arst on määranud operatsiooni, tuleb 1-2 nädalat enne operatsiooni teha vereanalüüs – kliiniline veri.
- 2-3 nädalat enne operatsiooni ei tohi tarvitada verd vedeldavaid ravimeid, näiteks aspiriini, ibuprofeeni . Võib kasutada parasetamoli. Operatsiooni ajaks ei tohi olla palavikku, ägedat köha, nohu.
- Vähemalt 6 tundi enne operatsiooni tuleb olla söömata-joomata, nätsu närimata.
- Operatsioonile tulles võtke kaasa kõik Teile vormistatud dokumendid (lepingud, saatekiri, infolehed, vereanalüüside vastused).

Operatsioon

Operatsioon teostatakse üldnarkoosis, operatsiooniga korrigeeritakse kõrvalestade kuju, suurust. Operatsioon kestab umbes 2 tundi. Opereeritakse tavaliselt mõlemat kõrvalesta korraga. Nahalõige tehakse kõrvalesta taha. Kõrvalestade korrigeerimist teostatakse nii lastel kui ka täiskasvanutel.

Pärast operatsiooni

- Operatsioonijärgselt rõhkside ümber pea. Nädal peale operatsiooni eemaldatakse niidid, vahetatakse ka side. Pärast sidemte eemaldamist tuleb kanda kaks nädalat ööpäevaringselt peapaela.
- Paistetust alaneb tavaliselt kahe nädala pärast.
- Kahe nädala jooksul peaks hoiduma füüsilisest koormusest ja kuumaprotseduuridest.

Olen tutvunud infolehe sisuga ja saan aru missugust operatsiooni mulle kavandatakse, olen saanud vastused mind huvitavatele küsimustele.

Patsiendi nimi		Allkiri	
Nõustava arsti nimi		Allkiri	

Kuupäev: ____ . ____ 200__ .a

Infoleht täidetakse kahes eksemplaris, millest üks jääb patsiendile ja teine haigusloo vahele.