

ADENOIDI EEMALDAMINE

Operatsiooni näidustused

Enne operatsiooni

- Kui arst on määranud operatsiooni, tuleb 1 - 2 nädalat enne operatsiooni teha vereanalüüsid (kliiniline veri ja hüübimine).
- 2 - 3 nädalat enne operatsiooni ei tohi tarvitada verd vedeldavaid ravimeid näiteks aspiriini.
- Operatsiooni ajaks ei tohi olla palavikku, ägedat köha või nohu.
- Vähemalt kuus tundi enne operatsiooni peab olema söömata ja joomata.
- Operatsioonile tulles võtke kaasa kõik Teile vormistatud dokumendid (lepingud, saatekiri, infolehed, vereanalüüside vastused).
- Kaasa võtta sussid, pidžaama.
- Lapsega jääb haiglasse üks saatja.

Operatsioon

Pärast operatsiooni

- Pärast operatsiooni on laps algul unine, pahur, toibub paari tunni jooksul. Esimese kahe tunni vältel peale operatsiooni ärge andke lapsele juua ega süüa.
- Adenoidi operatsiooni võimalik tüsistus on verejooks. Vahetult peale operatsiooni võib esineda veritsust ninast, neelust.
- Esimese kolme päeva jooksul peale operatsiooni peaks hoiduma füüsilisest koormusest, kuumaprotseduuridest, et ei tekiks veritsust.
- Nädalapäevad peaks hoiduma ka kollektiivist, et laps ei haigestuks.
- Lapsel võib esimestel päevadel peale operatsiooni esineda väike palavik, vajadusel määrab arst põletikuvastase ravi.
- Kui on pandud šundid, peaks vältima vee sattumist kõrva. Selleks tuleks kasutada kõrvatroppe.
- Pärast operatsiooni, kui kõik on korras, arsti vastuvõtule tulema ei pea.
- Veritsuse korral pöörduge Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskusesse.

Olen tutvunud infolehe sisuga ja saan aru, missugust operatsiooni mulle (minu lapsele) kavandatakse, olen saanud vastused mind huvitavatele küsimustele.

Patsiendi nimi		Allkiri	
Nõustava arsti nimi		Allkiri	

Kuupäev: / / 20 a.

Infoleht täidetakse kahes eksemplaris, millest üks jääb patsiendile ja teine haigusloo vahele.